

**DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA**

**PREPARO DE EXAME**

**COLONOSCOPIA**

**ATENÇÃO:**

- Para realização do exame o paciente deve seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame;
- Estar com acompanhante maior de 18 anos **COM DOCUMENTO COM FOTO**;
- No dia do exame o paciente **NÃO** irá **trabalhar, dirigir** ou realizar **qualquer atividade que requeira atenção**.

**MEDICAMENTOS:**

- 4 comprimidos de BISACODIL (ou CASSIA SENNA I. 33,5G) e DIMETICONA em gotas; e
- 150 G DE MANITOL EM farmácia DE manipulação OU 3 (três) FRASCOS DE MANITOL EM farmácia NORMAL.

**VÉSPERA DO EXAME:**

- Café da manhã: normal;
- Almoço e jantar: caldo (sopa batida);
- Tomar 02 comprimidos de BISACODIL (ou CASSIA SENNA I. 33,5G) e 40 gotas de DIMETICONA às 18 horas; e
- Tomar 02 comprimidos de BISACODIL (ou CASSIA SENNA I. 33,5G)) e 40 gotas de DIMETICONA às 22 horas.

**ATENÇÃO:**

- Beber líquidos à vontade (água, chá, sucos bem coados);
- Não beber leite e derivados, Coca-Cola e café;
- Não comer frutas que tenham sementes e verduras de folha; e
- Após as 22 horas **JEJUM ABSOLUTO** de comida.

**NO DIA DO EXAME – USAR ROUPAS LEVES:**

- Dissolver bem todo o manitol em 750 ml de limonada (coada) ou misturar os 3 frascos em suco concentrado (não adoçar);
- Tomar o conteúdo às 7 horas da manhã (um copo de 20 em 20 minutos);
- Andar bastante; e
- Poderá tomar líquidos até 12 horas (meio dia).

**ADICIONAL À COLONOSCOPIA**

**ATENÇÃO:**

- **Em casos de paciente grávida suspender o exame.**
- Para realização do exame o paciente deve seguir rigorosamente os preparos de véspera e dia do exame;
- **Não amamentar até 06 horas após o exame.**
- Estar com acompanhante maior de 18 anos **COM DOCUMENTO COM FOTO**;
- No dia do exame o paciente **NÃO** irá **trabalhar, dirigir** ou realizar **qualquer atividade que requeira atenção**.

PACIENTE DIABÉTICO?

**SIM**

Medicamentos Orais: Suspender o uso um dia antes do exame.

Insulina:

- Tomar 1/3 da dose no dia anterior ao exame; e
- Tomar 1/2 da dose no dia do exame.

**NÃO/PREPARO NORMAL**

**SE PACIENTE USAR:**

SE PACIENTE USAR: ANTI-INFLAMATÓRIO OU ANTI-COAGULANTE (DICLOFENACO, CETROFENO, PRODENI, NIMESULIDA, VARFARINA, TICLOPIDINA E AAS) suspender o uso e marcar exame após 7 dias.

**Avise caso não possa comparecer ao exame, para que outro paciente possa ser atendido.**

**Se o seu atendimento foi agendado pela Unidade Básica de Saúde, procure a mesma para**

**cancelar e reagendar. Se foi feito pelo próprio AME, ligue 0800-7264 0000.**